

カルシウム液剤

# シーエーアップ

グレープフルーツ味 500mL

指定医薬部外品

## 製品の特徴

シーエーアップは、グレープフルーツ風味で服用しやすい液体タイプのカルシウム剤です。1才のお子さまから幅広い年代の方に服用いただけます。



## 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること。  
医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書をもって医師または薬剤師に相談すること。  
服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、胃痛、食欲不振
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること。  
下痢、便秘。
- 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談すること。

成分分量 40mL (成人1日量) 中

成分	分量	はたらき
グルコン酸カルシウム水和物	3000mg (カルシウムイオンとして268.1mg)	骨格や歯の原料だけでなく、さまざまなカラダの機能調節に重要な役割を担っています。

添加物としてクエン酸水和物、D-ソルビトール、塩化Na、安息香酸、リボフラビンリン酸エステルNa、プロピレングリコール、pH調整剤、香料を含有する。

## 用法用量

次の1回量を1日1～2回服用する。  
(服用には添付の計量コップを使用ください。数字の単位はmLです。)

年齢	1回量
成人(15才以上)	20mL
11才以上 15才未満	15mL
7才以上 11才未満	10mL
3才以上 7才未満	5mL
1才以上 3才未満	2.5mL
1才未満	服用しないこと

(用法用量に関連する注意)

- 用法用量を守ること。(他のカルシウムを含有する製品を同時に使用する場合には、過剰摂取などに注意すること)
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 効能効果

次の場合の骨歯の発育促進：虚弱体質、腺病質<sup>注</sup>。

妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止。

<sup>注</sup>「腺病質」とは貧血などになりやすい虚弱・無力体質を指します。

## 保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 服用のつどフタをよくしめること。
5. 雑菌などの汚染のおそれがあるので、ピンの口に直接口をつけて服用したり、計量コップに入れた薬液をビンにもどさないこと。
6. 品質保持の点から開栓後3週間以内に服用すること。
7. 開栓後、味、臭いに変化があり異常を感じた場合は直ちに服用を中止すること。
8. ピンの口、計量コップは常に清潔に保つこと。
9. ピンの口、キャップに白い結晶が現れたり、白い沈殿が生じることがありますが、これは内容成分のカルシウムの結晶です。
10. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

## 【問い合わせ先】

1. 購入した販売店
2. 日水製薬医薬品販売株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987  
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時  
(土・日・祝日を除く)



製造販売元

日水製薬医薬品販売株式会社

東京都台東区上野1-18-11