

△ 使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

便祕、下痢。

3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になつたり品質が変わる)。
- 生産成分が沈殿することがありますか、効力には変わりありません。
- 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

副作用被害救済制度

000120-149-931

ガラス:ビン 金属:キャップ
4987926328097
AS2104

製造販売元

健創製薬株式会社

東京都中央区日本橋小舟町9-17
電話:03-3527-3690

健創清心液®

50mL

成分分量 1本(50mL)中

ゴオウチンキ	2000μL(原生葉として20mg)
ロクジョウチンキ	350μL(原生葉として100mg)
ニンジン流エキス	1500μL(原生葉として1500mg)
センキュウ流エキス	100μL(原生葉として100mg)
トウキ流エキス	60μL(原生葉として60mg)
カシゾウ流エキス	100μL(原生葉として100mg)
ケイヒ流エキス	100μL(原生葉として100mg)
オウキ流エキス	300μL(原生葉として300mg)
リボフラビレ(ビタミンB2)	10 mg
ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	10 mg
酢酸d-α-トコフェロール(ビタミンE)	10 mg
無水カフェイン	50 mg
(アルコール	1mL以下)
添加物:	クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、酒石酸、pH調節剤、香料、ホリオキシエチレン硬化ヒマシ油、水アメ、白糖、ブトウ糖、カラメル、塩化Na。

〈成分分量に関連する注意〉
味を変えることがある。

用法用量 次の1回量を1日1回服用する。

年齢	1回量
成人(15才以上)	1本
15才未満	服用しないこと

効能効果

滋養強化。虚弱体質。肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

製造番号 ◆ 使用期限(年・月)